



Metodický pokyn pro přípravu pacienta s alergickou anamnézou před aplikací kontrastní látky při radiodiagnostických vyšetřeních

RDG pracoviště musí být vybaveno léky a materiálem pro poskytnutí resuscitační péče při závažné reakci po podání kontrastní látky (KL) vč. defibrilátoru a zdroje kyslíku. Všechny pomůcky a léky musí být udržovány v použitelném stavu.

A. Pacienti bez alergie v anamnéze

1. Bez zvláštních opatření.

B. Pacient s jakoukoliv alergií v anamnéze (vyjma jódu a jódových KL)

Pozn.: tito pacienti mají významně zvýšené riziko alergické reakce a anafylaktického šoku po aplikaci jódové KL. U některých alergenů je možná zkřížená alergická reakce.

2. RDG vyšetření se provádí ambulantně bez asistence lékařů ARO, přípravu organizuje lékař RDG oddělení.
3. Pacient s pozitivní anamnesou na jakoukoliv alergii musí podstoupit některou z níže uvedených příprav, bez ní nemůže být vyšetření provedeno. Všichni pacienti s alergickou anamnesou musí mít před vyšetřením zajištěn žilní vstup, napojenu infuzi krystaloidu 500 ml, změřen TK a puls, ev. saturaci O².
4. Jako premedikaci podat Prednison 20 mg p.o. 12 a 1 hod před vyšetřením + Dithiaden 1 tbl. p.o. 1 hod před výkonem.
5. Před akutním RDG vyšetřením s KL podat Hydrocortison 100 mg i.v. 30 min před aplikací kontrastní látky.

C. Pacient s alergií na jód nebo jódovou kontrastní látku

1. RDG vyšetření se provádí za hospitalizace - stačí přijetí odpoledne před plánovaným výkonem a 2 hod sledování po výkonu. Přípravu organizuje ošetřující lékař, dohled při vyšetření provádí anesteziolog.
2. Na žádance pro RDG vyšetření pacienta s alergií na jód nebo jódovou KL nesmí chybět údaje o alergické anamnéze, kromě toho musí být vystavena žádanka na anesteziologický dohled.
3. K RDG vyšetření u pacienta s alergií na kontrastní látku je nutno předem domluvit přítomnost anesteziologa, u jiných alergií stačí přítomnost zdravotní sestry – specialistky (ARIP), anesteziolog je přivolán v případě komplikací.
4. Jako premedikaci podat Prednison 20mg p.o. 12, 6 a 1 hod před operací. Kromě toho 1 hod před vyšetřením podat Dithiaden 2 tbl a 40 mg Famosanu p.o.
5. Po vyšetření je pacient sledován na oddělení, kde byl přijat. Opakovaně jsou kontrolovány vitální funkce – TK, P, saturace O₂, ev. další jako výskyt exantému, nevolnost, dušnost.... O propuštění z nemocnice rozhoduje ošetřující lékař po kontrole stavu pacienta, ale ne dříve než za 2 hodiny od provedení výkonu. Pac. musí být poučen o zákazu řízení motorových vozidel, práce se stroji a ve výškách.